provet

provet

Merkez:
Çavuşoğlu Mah. Başkumandan Cad. No:28 Kartal / İstanbul
Tel: + 90 216 442 02 81 | + 90 216 383 15 30 Fax: +90 216 442 66 04

Fabrika:
Çekirdeksiz Organize San. Böl. 210. Cad. No:7 Polatlı / Ankara
Tel: +90 312 626 50 92 Fax: +90 312 626 50 94

www.**provet**.com.tr

İÇİNDEKİLER

03-07 **ANTİBAKTERİYELLER**
Amoxycure LA • Cefamilk-180 • Cefcloren
Clavon • Doxymix %20 • Penstrep 20/20
Tetraplex-LA • Sulfamid-T • Viodox

AĞRI VE YANGI GİDERİCİLER 08-09
Inflamex • Scoban • Tobrofin

10-11 **ANTİPARAZİTERLER**
Imozan • Mectizan IC • Ovitap

ENDOKRİN ÜRÜNLER 12-13
Dexacure • Fertilin • Minoprost
Provet Oksitosin

14-18 **METABOLİK ÜRÜNLER**
Calcicaf • Ca-25 • Fitadinon-K
Neuron-B • Ovostim • Provet-D3
Provet • Vitamin C • Vetaminfort • Vitaljek-ADE

KLİNİK ENJEKSİYONLUK ÜRÜNLER 19-20
Antistamin C • Doxaprol • Mucolit
Reversal • Tomidin

21-22 **MASTİTİS METRİTİS ÜRÜNLERİ**
Masticure Kuru • Masticure Sağım
Octafil • Total-4

TIBBİ OLMAYAN ÜRÜNLER 23-24
Mastar • Rumenas • Viocid Blue

25-27 **PET ÜRÜNLERİ**
Cestodan • Combipet • Reversal
Sedapet • Tomidin

Amoxycure LA

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Her ml'si;
150 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir.

KULLANIM SAHASI:
Sindirim sistemi enfeksiyonları,
Solunum sistemi enfeksiyonları,
Genital sistem enfeksiyonları,
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır ve koyunlarda kas içi, köpeklerde kas içi veya deri altı yolla uygulanır.
Pratik olarak 1 ml / 10 kg c.a. uygulanır.
Gerekli görüldüğünde uygulama 48 saat sonra tekrarlanabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır ve koyunlar et için: 30 gün.
Sığır süt için: 5 gün (10 sağım).
Koyun süt için: 7 gün (14 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılan şişeler 28 gün içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
50 ml, 100 ml ve 250 ml renksiz cam şişelerde ve karton kutularda satışa sunulmuştur.

Cefamilk-180 Mono

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Her ml'si;
180 mg Sefaleksin baza eşdeğer 189,3 mg Sefaleksin monohidrat içerir.

KULLANIM SAHASI:
Sığır, kedi ve köpeklerde antibakteriyel tedavide kullanılmaktadır. Sefaleksin, bakterisidal etkiye sahip, çok sayıda Gram pozitif (+) ve Gram negatif (-) bakterilere etkili, geniş spektrumlu bir antibakteriyel ajandır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Cefamilk-180 Mono Enjeksiyonluk Süspansiyon, kedi ve köpeklerde kas içi veya deri altı yolla, sığırlarda ise sadece kas içi yolla enjekte edilir. Enjeksiyondan sonra enjeksiyon bölgesine masaj yapılması önerilmektedir.Sığırlarda; 7 mg/kg (1 ml/25 kg), günde bir kez 5 güne kadar uygulanmaktadır.Kedi ve köpeklerde; önerilen doz 10 mg/ kg / gün, 5 güne kadar uygulanmaktadır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 19 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt veren ineklerde kalıntı arınma süresi sıfır (0) gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C'nin altında saklanmalıdır.
Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.
Güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobütil tıpalı, 50 ml'lik tip III; 100 ml ve 250 ml'lik tip II renksiz cam flakonlarda karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

Cefcloren

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Her ml'si;
50 mg Seftiofura eşdeğer **Seftiofur HCl** içerir.

KULLANIM SAHASI:
Sığırlarda seftiofura duyarlı bakterilerden kaynaklanan solunum ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU
Sığırlar için genel farmakolojik doz 1 mg/kg vücut ağırlık/gün olup, pratik olarak 1 ml/50 kg vücut ağırlığa verilir. Solunum yolları hastalıklarında; 1 mg/kg dozda deri altı yolla 3-5 gün gün uygulanır. Pratik doz: 1 ml/50 kg vücut ağırlığı.Akut interdijital nekrobasillozda: 1 mg/kg dozda deri altı yolla 3 gün uygulanır. Pratik doz: 1 ml/ 50 kg vücut ağırlığı. Akut puerperal metritislerde: 1 mg/kg dozda deri altı yolla 5 gün üst üste uygulanır. Pratik doz: 1 ml /50 kg vücut ağırlığı. (Postpartum metritlerde bazı vakalarda destekleyici ek tedavi gerekli olabilir.)

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır ve koyunlar et için: 7 gün.
Sığır süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25°C) saklanır. Dondurulmamalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonra 25°C'in altında saklanmak şartı ile 28 gün süresince kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobütil tıpalı, 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik renksiz tip II cam flakonlar, karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

Clavon

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Her ml'si;
140 mg Amoksisilin (Trihidrat halinde)
35 mg Klavulanik asit (Potasyum klavulanat halinde) içerir.

KULLANIM SAHASI:
Amoksisilin ve klavulanik asit kombinasyonuna duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığırlarda kas içi, köpeklerde kas içi veya deri altı verilir.
Pratik olarak: 1 ml / 20 kg c.a. verilir.
Tedaviye 3-5 gün devam edilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 20 gün.
Sığır süt için: 4 gün (8 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Orijinal ambalaj ve kutusu içerisinde, 25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Güneş ışığından korunarak saklanmalı. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılan şişeler 28 gün içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
50 ve 100 ml'lik renksiz cam şişeler ve karton kutularda satışa sunulmuştur.

Doxymix %20

Oral Çözelti

Her ml'si;
200 mg Doksisiklin'e eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

KULLANIM SAHASI:
Etçi tavuk ve etçi hindilerde sindirim ve solunum yolu enfeksiyonları,
Buzağılarda solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları,
Güvercinlerde ve süs kuşlarında Chlamydiosis ve Ornithosis tedavisinde kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Etçi tavuk ve etçi hindilerde her 100 kg canlı ağırlık için günde 5-10 ml çözelti günlük içme suyuna katılarak uygulanır. Buzağılarda ise her 25 kg canlı ağırlık için günde 1-2,5 ml çözelti doğrudan veya içme suyu ile birlikte içirilir. Güvercinlerde ve süs kuşlarında 1 litre içme suyuna 0,5-1 ml ilaç katılır. Tedavi süresi bütün türler için 3-5 gündür.

GIDALARDA İLAÇ KALINTLARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Buzağı et için: 14 gün.
Tavuk et için: 4 gün.
Hindi et için: 6 gün.
Yumurta elde edilen kanatlılara uygulanmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25°C), nemden ve güneş ışığından uzakta saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml'lik beyaz renkli polietilen şişelerde tekli olarak karton kutuda; 1 L' lik beyaz polietilen şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Penstrep 20/20

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Her ml'si;
200.000 IU Benzilpenisilin prokain
200 mg Dihidrostreptomisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI:
Penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, koyun ve atlarda;
Derin kas içi enjekte edilir.
Pratik olarak: 1 ml / 20 kg c.a. verilir.
Günde bir, toplamda 3 uygulama yapılır.
Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır ve koyunlar et için: 60 gün.
Sığır ve koyun süt için: 8 gün (16 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C 'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurulmadan saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik renksiz cam şişeler, karton kutularda satışa sunulmuştur.

Sulfamid-T

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
40 mg Trimetoprim
200 mg Sülfadoksin içerir.

KULLANIM SAHASI:
Sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde; sülfadoksin ve trimetoprim kombinasyonuna duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem, deri ve eklemlerin enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kas içi, deri altı ve yavaş damar içi yollarla uygulanabilir.
1 ml / 10-15 kg canlı ağırlığa günde bir enjeksiyon şeklinde uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTLARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır, koyun ve keçi et için: 14 gün
Sığır, koyun ve keçi süt için: 5 gün (10 sağım)

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda ısısında (15 - 25°C) ve güneş ışığından korunarak saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml'lik amber renkli cam şişelerde karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

Tetraplex-LA

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
200 mg Oksitetrasiklin HCl içerir.

KULLANIM SAHASI:
Sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı bakterilerden kaynaklanan;
- Solunum sistemi hastalıkları (Sinuzit, Mikoplazmoz)
- Sindirim sistemi hastalıkları (Kolibasilloz, Salmonelloz, diğer gastroenteritler),
- Metrit ve mastitlerde lokal tedaviye destek amacıyla,
- İdrar yolları enfeksiyonları,
- Karaciğer apseleri ve ayak çürüğü enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kas içi ve deri altı yolla 20 mg/kg canlı ağırlık dozda (1 ml/10 kg canlı ağırlık) uygulanır.
Gerekli görüldüğünde 72 saat sonra doz tekrarı yapılabilir.
Sığırlarda 10 ml, koyun ve keçilerde 5 ml'den fazla enjeksiyonlar ikiye bölünmelidir.
Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Damar içi yolla kesinlikle uygulanmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır, keçi ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığır, keçi ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, keçi ve koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılan flakonlar 28 gün içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Viodox

Antibakteriyel Sprey

200 ml'lik metal şişe;
120 ml koyu mavi-mor renkli çözeltinin içinde;
2,52 gram Doksisiklin Hiklat içerir.

KULLANIM SAHASI:
Doksisikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen deri, meme, tırnak enfeksiyonlarında ve yaralanmalarda topikal tedavi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilere;
Temizlenen bölgeye 15-20 cm uzaklıktan 1-2 saniye püskürtülerek uygulanır. Günde bir-iki uygulama yapılır. İyileşme tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için sıfır (0) gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25° C) ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Isı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
200 ml, 300 ml ve 500 ml'lik metal kutularda satışa sunulmuştur.

Inflamex

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
50 mg Fluniksin (Fluniksin meglumin şeklinde) içerir.

KULLANIM SAHASI:
Genel olarak at, sığır ve köpeklerde;
Kas ve iskelet sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi ve ürogenital sistemin ağrılı, ateşli ve yangılı hastalıklarında; ağrı kesici, ateş düşürücü ve yangı giderici olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Kas içi veya damar içi verilir.
Sığır: 2 ml/45 kg c.a. / gün. Uygulama 2-3 gün sürer.
At: 1 ml / 45 kg c.a. / gün. Uygulama 5 güne kadar sürebilir.
Köpek: 0,5 ml / 25 kg c.a. / gün. Uygulama 2-3 gün sürer.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kasaplık hayvanlar et için: 21 gün.
Süt için: 5 gün (10 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25 °C 'in altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 100 ml ve 250 ml'lik kahverengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Scoban

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
4 mg Skopolamin N-Bütil bromid, 500 mg Metamizol sodyum monohidrat içerir.

KULLANIM SAHASI:
Sindirim sistemi,
Ürogenital sistem,
Kas-iskelet sisteminde çeşitli sebeplerden meydana gelen sancılı, ağrılı ve yangılı durumlarda semptomatik tedavi amacıyla kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır ve atlarda,
Kas içi veya damar içi enjekte edilir.
Pratik doz:
Yetişkin sığırlara: 2 ml / 25 kg c.a. kas içi veya damar içi,
Buzağılara ve danalara: 1 ml / 10-20 kg c.a. kas içi,
Atlara: 1 ml / 10-25 kg c.a. damar içi verilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kasaplık hayvanlar et için: 12 gün.
Sağmal hayvanlarda süt için: Kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Dondurulmamalıdır.
Zamanla çözelti renginde ürünün aktivitesini etkilemeyen bir koyulaşma gözlenebilir.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 20, 50 veya 100 ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Tobrofin

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
100 mg Ketoprofen
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Kas ve iskelet sisteminin ağrılı ve romatizmal bozukluklarında,
Yüksek ateşle birlikte seyreden solunum sistemi enfeksiyonlarında,
Endotosik şoklarda akut yangının giderilmesi amacıyla,
Sindirim sistemi bozukluklarından kaynaklanan sancılarda,
Aseptik eklem yangılarında kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır ve atlarda,
Kas içi veya damar içi kullanılır.
Pratik doz:
Atlar için, 1 ml / 45 kg c.a. verilir.
Sığırlar için, 3 ml / 100 kg c.a. verilir.
Tedavi, belirtilerin ortadan kalkmasından sonraki güne kadar devam eder.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: Damar içi uygulama 1 gün.
Sığır et için: Kas içi uygulama 4 gün.
Sığır süt için: "0" sıfır gün.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C 'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk kullanımdan sonraki raf ömrü 28 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

İmozan

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
120 mg İmidocarb dipropionate
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Babesiosis ve anaplasmosis tedavisi ve önlenmesi için kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır ve koyun Babesiosis tedavisi için farmakolojik doz: 1,2 mg / kg c.a.'dır.
Sığırlardaki Anaplasmosis tedavisi için farmakolojik doz: 3 mg / kg c.a.'dır.
Sığırlarda Koruma dozu: 3 mg / kg c.a. dır.
Tek tırnaklılarda: 2,4 mg / kg c.a. dır.
Köpeklerde: 6 mg / kg c.a.dır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 28 gün.
Koyun et için: 21 gün.
Koyun süt için: Kullanılmaz.
Sığır süt için: 2 gün(4 sağım).
Sığırlarda anaplasmosis tedavisi (4-6 hafta 3mg/kg c.a) et için: 21 gün.
Sığırlarda anaplasmosis tedavisi (4-6 hafta 3mg/kg c.a) süt için: 7 gün (14 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 20 ve 50 ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Mectizan IC

Enjeksiyonluk Çözelti

Her 1 ml'si;
10 mg İvermektin
100 mg Klorsulon
içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI:
Sığırlarda ivermektin ve klorsulona duyarlı iç ve dış parazit mücadelesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Deri altı enjekte edilir.
Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına uygulanır.
Genel farmakolojik doz:
İvermektin: 0,2 mg / kg canlı ağırlık,
Klorsulon: 2 mg / kg canlı ağırlıktır.
Pratik doz:
1 ml / 50 kg canlı ağırlıktır.
10 ml'den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi önerilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son ilaç kullanımından itibaren sığırlarda 35 gündür. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.
Güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik bal renkli cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

Ovitap

Oral Tablet

Her tablet;
375 mg Levamizol
750 mg Oksiklozanid
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Ergin Karaciğer kelebekleri, Akciğer kıl kurtları, Mide-Bağırsak kıl kurtları, Askaritler, Göz kurdu mücadelesinde etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Sığır ve koyunlarda:
Oral yolla yutturarak kullanılır.

Kuzu	25 kg	1/2 tablet
Koyun	50 kg	1 tablet
Dana	100-200 kg arası	2-4 tablet
Sığır	200-400 kg arası	4-8 tablet

İlkbaharda meraya çıkmadan önce ve sonbaharda meradan döndükten sonra yılda iki kez uygulama yapılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır eti için: 28 gün.
Koyun eti için: 21 gün.
Sütü insan tüketiminde kullanılan sağmal inek ve koyunlarda kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15 - 25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda her biri 10 adet tablet içeren blisterlerde olmak üzere; 10, 50 ve 100 tablet şeklinde satışa sunulmaktadır.

Dexacure

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
2 mg Deksametazon sodyum
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Yangınsal reaksiyonlarda yangının giderilmesi,
Ketozisde kan glukoz seviyesinin düzenlenmesi,
Romatizmal, alerjik ve dermatolojik hastalıklarda kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, at, köpek, kedilerde;
Kas içi, damar içi veya eklem içi kullanılır.
Pratik doz:
Sığır ve atlar için: 1,5ml / 50kg c.a kas içi veya damar içi,
Köpek ve kediler için: 0,5ml / 50kg c.a kas içi veya damar içi kullanılır.
Eklem içi:
Sığır ve atlar için: 3-6 ml,
Köpek ve kediler için: 0,5-1 ml uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 21 gün.
Koyun süt için: 3 gün (6 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanmalıdır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 50 ve 100ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Fertilin

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
0,004 mg Buserelin asetat
içerir.

KULLANIM SAHASI:
İneklerde;
Ovaryum kaynaklı infertilitenin tedavisi ve gebelik oranının artırılması,
PGF2-alfa ile birlikte kullanıldığında östrus senkronizasyonu ve doğum ile gebe kalma arasındaki sürenin azaltılması,
Kısraklarda;
Olgun foliküllerin uyarılarak ovule olması ve böylece ovulasyonun aşıma daha yakın olarak senkronize edilmesi,
Tavşanlarda;
Gebelik oranının artırılması ve ovulasyon indüksiyonu için kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kas içi, deri altı, damar içi yolla uygulanır.
Sığır: 2,5- 5ml,
At: 10ml,
Tavşan:0,2ml uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25 °C) ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Açılan şişeler oda sıcaklığında 14 gün içinde kullanılabilir.
İmal tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 5 ml'lik renksiz cam şişelerde 10 adetlik gruplar halinde, 10 ml ve 20 ml'lik renksiz cam şişelerde tekli olarak satışa sunulmaktadır.

Minoprost

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
250mcg Kloprostenol'e eşdeğer
Kloprostenol sodyum
içerir

KULLANIM SAHASI:
Sığır ve atlarda luteolizis amacıyla kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kas içi enjekte edilir.
Pratik doz:
Sığır: 2 ml, At: 1-2 ml.
Kullanım ayrıntıları için prospektüsü okuyunuz.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kasaplık hayvanlar et için: 1 gün.
Sağmal hayvanlarda süt için: "0" sıfır gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi "0" GÜNDÜR (SÜTTE)

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 2 ml'lik renksiz cam flakonlarda 24 adetlik gruplar halinde ve 20 ml'lik renksiz cam flakonlarda tekli olarak satışa sunulmuştur.

Provet Oksitosin

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
10 IU Oksitosin
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Uterus tembelliğinin giderilmesi,
Metritis olgularında içeriğin boşaltılması,
Retensiyo sekundinarumun sağaltımı,
Sezeryan sonrası uterus hareketlerinin teşvik edilmesi,
Yavru zarlarının atılması ve kanamaların kontrol altına alınması,
Doğum sonrası uterus involusyonu,
Meme hastalıklarının tedavisinde sütün boşaltılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kas içi, deri altı, damar içi kullanılır.
Uterus tembelliği, Metritis ve sezeryan operasyonlarında pratik doz tablosu:

	Kas içi (I.M.)		Damar içi (I.V.)	
At, sığır	75-100 IU	7,5-10 ml	2,5-10 IU	0,25-1 ml
Koyun, keçi	35-50 IU	3,5-5 ml	0,5-2,5 IU	0,05-0,25 ml
Köpek	5-25 IU	0,5-2,5 ml	0,5 IU	0,05 ml
Kedi	5-10 IU	0,5-1 ml		

Meme bezlerinden sütün boşaltılması amacıyla pratik doz tablosu:

	Damar içi (I.V.)	
At, sığır	10-30 IU	1-3 ml
Koyun, keçi	5-20 IU	0,5-2 ml
Köpek ve kedi	1-10 IU	0,1-1 ml

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi "0" GÜNDÜR (ET ve SÜT için)

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 10 ml ve 50 ml'lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

Calcicaf

Enjeksiyonluk Çözelti

Beher ml'de;
200 mg Kalsiyum glukonat
16 mg Magnezyum glukonat
1,64 mg Kafein
16,40 Sodyum salisilat
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Sığırlarda süt humması ve çayır tetanisi,
Koyunlarda gebelik toksemisi,
Buzağılarda süt tetanisi,
Atlarda tetani ve azotüri,
Köpeklerde eklampsi,
Raşitizm, osteomalazi, kemik çatlamaları ve kırılmaları, diş çürükleri olguları,
Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar, ürtiker, beslenme bozuklukları, kalsiyum ve fosfor dengesi bozuklukları,
Kanamalar ve kollaps durumları,
Gıda zehirlenmeleri, zehirli hayvan ısırmaları ve sokmaları, klorlu hidrokarbon insektisitlerle zehirlenmeler,
Kalsiyum ve magnezyum eksikliklerine bağlı reprodüksiyon sorunları,
Çeşitli enfeksiyöz hastalıkların tedavisi sırasında koruyucu ve destekleyici olarak kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Kas içi, deri altı veya yavaş damar içi kullanılır.
Pratik doz tablosu

Sığır	100 - 250 kg c.a.	100 - 250 ml
Sığır	250 - 500 kg c.a.	250 - 500 ml
At	250 - 500 kg c.a.	250 - 500 ml
Buzağı - Tay	50 - 100 kg c.a.	100 - 300 ml
Koyun, Keçi	50 kg c.a.	50 - 100 ml
Köpek	5 - 10 kg c.a.	5 - 10 ml

Hafif hayvanlarda küçük, ağır hayvanlarda büyük doz seçilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi "0" GÜNDÜR (ET ve SÜT için)

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15 - 25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
500 ml'lik renksiz cam şişelerde 1 veya 12 adetlik strafor ambalaj içerisinde satışa sunulmaktadır.

Ca-25

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
250 mg Kalsiyum glukonat
45 mg Magnezyum klorür
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Kalsiyum ve magnezyum eksikliklerinde,
Hipokalsemi, laktasyon tetanisi, hipomagnezemik tetani, seyahat ve çayır tetanilerinde,
Raşitizm ve osteomalasi hallerinde,
Alerjiler, zehirlenmeler ve zehirli hayvan sokmalarında kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, at, koyun ve keçilerde;
Damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.
Pratik doz tablosu;

Sığır	250 - 500 kg c.a.	250 - 500 ml
At	250 - 500 kg c.a.	100 - 250 ml
Koyun, Keçi	25 - 50 kg c.a.	50 - 150 ml

Damar içi uygulaması yavaş yapılmalı, deri altı ve kas içi uygulamalarında doz bölünerek 3- 4 yere ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi "0" GÜNDÜR (ET ve SÜT için)

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15 - 25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 ml ve 250 ml'lik renksiz cam şişelerde karton kutu içerisinde satışa sunulmaktadır.

Fitadinon-K

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
10mg Vitamin K1 (Fitanadion)
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Hemostatik amaçla kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, domuz, koyun, keçi, at, kedi, köpeklerde;
Akut olmayan durumlar:
At, sığır: 0,5-2,5 ml/10kg c.a. kas içi veya deri altı,
Koyun, keçi, köpek, kedi: 0,25-2,5 ml/10kg c.a. kas içi veya deri altı uygulanır.
Akut durumlar:
At, sığır, koyun, keçi, köpek, kedi: 0,5-2,5 ml/10kg c.a. damar içi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25 °C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutularda 20 ml'lik koyu renkli cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

Neuron-B

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
100 mg Vitamin B1
10 mg Vitamin B6
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Genel sinirlilik ve aşırı duyarlılık halleri,
Nekahat dönemleri, halsizlik, iştahsızlık, beslenme yetersizlikleri,
Ruminantlarda akut rumen bozuklukları,
Çeşitli musküler bozukluklar, sinir dokusu hastalıkları, dermatitis, hepatitis, intoksikasyonlar,
Ketozis, gebelik toksemisi durumlarında ve enfeksiyonların tedavisinde destek olarak kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Ruminantlar, at ve karnivorlarda;
Kas içi, deri altı veya damar içi (atlar hariç) verilebilir.
Pratik olarak 1 ml / 20 kg c.a. uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
50ml, 100 ml ve 250 ml' lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Ovostim

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
15 mg Beta-Karoten
20 mg Alfa-Tokoferol asetat
(Vitamin E)
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Ovaryum aktivitesinin ve üreme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla ve antioksidan olarak kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır ve atlarda;
Kas içi veya deri altı enjekte edilir.
Pratik olarak: 3,5-7 ml / 100 kg c.a. verilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25 °C) ve ışıktan koruyarak saklayınız. Açılan şişelerin soğutucuda (2-8 °C) saklanması ve 28 gün içinde kullanılması önerilir. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 100 ve 250 ml'lik bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Provet-D3

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
1 milyon IU Vitamin D3
(Kolekalsiferol)
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Kemik gelişme bozukluklarının tedavisi (raşitizm, osteomalasi),
Genç besi hayvanlarında iskelet sistemi gelişiminin stimule edilmesi,
İneklerde hipokalseminin önlenmesinde ve tedavisinde,
Ca-P metabolizmasına yardımcı olarak,
Güneşten yeterince faydalanamayan hayvanlar ile yarış atlarında kemik gelişimi ve metabolizmasının desteklenmesi,
Vitamin D3 emilimine engel olan metabolik bozukluklarda (safra salgılarının engellenmesi, zehirlenmeler) kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde;
Kas içi enjekte edilir.
Pratik doz:
Ruminantlar ve atlara: 1 ml / 50 kg c.a. dır.
Köpek ve kedilerde: 0,1-0,5 ml / 10 kg c.a. verilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 21 gün.
Sığır ve koyun süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C), ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 10, 20, 50 ve 100 ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Provet Vitamin C

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
250 mg Askorbik asit
(Vitamin C)
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında metabolik direncin artırılmasında,
Ortam sıcaklığına veya diğer unsurlara bağlı stres hallerinde,
Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
At, ruminant ve karnivorlarda:
Kas içi, deri altı, damar içi yolla kullanılır.
Yetişkin at ve sığırlara: 50-100ml
Genç at ve sığırlara : 10-30 ml
Koyun ve keçilere : 5-25 ml
Köpeklere : 1-5 ml
Kedilere : 0,5-1 ml uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15 - 25 °C) ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
Doğrudan güneş ışığına mağruz bırakılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
20, 50, 100 ml'lik amber renkli cam şişeler, karton kutularda satışa sunulmuştur.

Vetaminfort

Oral Çözelti

Bileşenler Listesi:
11.1.6 **Kalsiyum klorür % 9**
11.2.6 **Magnezyum klorür % 0,7**
11.4.1 **Sodyum klorür % 0,4**

KATKI MADDELERİ (Lt'de):
İz elementler
E3 Kobatl (Kobalt klorid monohidrat): 1.765 mg
E1 Demir (Demir klorid hekzahidrat): 1.810 mg
3b603 Çinko (Çinko oksit): 775 mg
E4 Bakır (Bakır sülfat pentahidrat): 700 mg
Amino asitler
3c301 Metiyonin (DL metiyonin): 10 g
3.2.1 Lizin (L-Lizin): 5 g
Koruyucular
E338 Fosfor (Ortofosforik asit): 235 g

KULLANIM TALİMATI:
Kanatlı ve ruminantlarda çeşitli mineral eksiklerinde ve stres faktörlerinden kaynaklanan durumlarda metabolizmanın desteklenmesi amacıyla kullanılır.
Besi Sığırları : 100 kg canlı ağırlık için, 20 ml Vetaminfort / 1 L içme suyu
Süt Sığırları : 100 kg canlı ağırlık için, 30 ml Vetaminfort / 1 L içme suyu
Buzağı ve Danalar : 15 ml Vetaminfort / 0,5 L içme suyu
Koyun ve Keçiler : 10 ml Vetaminfort / 2 bardak içme suyu
Kuzu ve Oğlaklar : 5 ml Vetaminfort / 1 ton içme suyu
Tavuk ve Hindiler : 2,5-5 L Vetaminfort / 1 ton içme suyu
Civciv ve Piliçler : 1-2 L Vetaminfort / 1 ton içme suyu

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında saklanır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
1litre'lik polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

Vitaljek-ADE

Enjeksiyonluk Çözelti

Her 100 ml'si;
5 gram (8,5 milyon IU)
Vitamin A palmitat
100 mg (4 milyon IU) Vitamin D
(Kolekalsiferol)
5 gram (5.000 IU) Vitamin E
(Tokoferol asetat)
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Besi ve süt hayvanlarında yüksek verim dönemlerinde artan ihtiyacın karşılanması,
Çeşitli metabolik olaylarda ve bozukluklarda destekleyici olarak kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığırlara kas içi, koyun ve keçilere deri altı uygulanır.
Besi danalarına: 3 ml,
Yetişkin sığırlara: 5 ml,
Buzağılara: Doğumdan 1 hafta sonra 1 ml,
Koyun ve keçilere: 1-2 ml verilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutularda 50, 100 ve 250 ml'lik koyu renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Antistamin-C

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
25 mg Klorfeniramine eşdeğer
Klorfeniramin maleat
içerir.

KULLANIM SAHASI :
Solunum yolları hastalıklarında bronkospazmın çözülmesi ve öksürüğün yatıştırılması amacıyla antibiyotiklerle kombine olarak,
Ürtiker, alerjik dermatitis, alerjik rhinitis ve laminitisde tedavisinde antihistaminik olarak kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, at , koyun ve keçilerde;
Kas içi , deri altı veya damar içi enjekte edilir.
Pratik olarak 1 ml / 50 kg c.a. verilir.
Uygulama 3-5 gün sürer.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25 ºC), ışıktan korunarak saklanır.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutuda 20 ve 50 ml'lik bal rengi cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Doxaprol

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
20 mg Doksapram HCl
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Anestezi sonrası uyanmanın ve reflekslerin başlatılmasının hızlandırılması,
Merkezi sinir sisteminden kaynaklanan depresyonlarda solunumun uyarılması,
Yeni doğan köpek, kedi, buzağı ve kuzularda; Güç doğum ve sezaryen sonrası solunumun başlatılması ve desteklenmesi amacıyla kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Anestezi sonrasında;
Köpek ve kedilerde; damar içi anestesi sonrası 0,25-0,5 ml damar içi,
Köpek ve kedilerde; inhalasyon anestesi sonrası 0,05-0,1 ml damar içi,
Atlarda; damar içi anestesi veya inhalasyon sonrası 5-10 ml/200 kg c.a. damar içi uygulanır.
Yeni doğanlarda;
Yavrunun büyüklüğüne ve solunum depresyonuna göre değişmek üzere;
Yavru köpekler: 0,05-0,25 ml damar içi, deri altı veya dil altı,
Yavru kediler: 0,05-0,1 ml damar içi, deri altı veya dil altı,
Buzağı: 2-5 ml damar içi, deri altı veya dil altı,
Kuzularda: 0,25-0,5 ml damar içi, deri altı veya dil altı verilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve süt için: "0" sıfır gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25 °C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Açılan şişeler aynı gün kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 2 ml' lik renksiz cam şişelerde 24 adetlik gruplar halinde ve 20 ml' lik renksiz cam şişelerde tekli olarak satışa sunulmaktadır.

Mucolit

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
3 mg Bromheksin HCl
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Solunum sistemi hastalıklarında solunum yollarında biriken mukusun akıcı hale getirilmesi ve uzaklaştırılmak amacıyla tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kanatlılarda oral yolla, sığır ve atlarda kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır.
Pratik doz: At ve sığırlar için 17 ml / 100 kg c.a. kas içi uygulanır.
Kanatlılar: 300 kg c.a. için içme suyuna 50 ml katılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR::
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kasaplık hayvanlar et için: 3 gün.
Sağmal hayvanlar süt için: Kullanılmaz.
Kanatlı hayvanlar yumurta için: Kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25 °C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Açılan şişeler aynı gün kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde 50 ml'lik amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

Masticure Kuru

Meme İçi Süspansiyon

Her 10 gram enjektör;
250 mg Sefaleksine eşdeğer Sefaleksin monohidrat,
250 mg Neomisine eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI:
Kuru dönemdeki ineklerde mastitis tedavisinde kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kullanmadan önce hasta memeler mutlaka sağılıp sütü boşaltılmalıdır.
Meme başı uygun şekilde temizlendikten sonra her memeye 1 enjektör içeriği verilir.
Uygulama bir kere yapılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 28 gün.
Sığır süt için(Doğumdan sonra): 4 gün (8 sağım).
Sığır süt için(Erken doğum): 14 gün (28 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (25°C 'nin altında) saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız. Güneş ışığından uzakta saklanır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
10 g'lık beyaz opak polietilen enjektörler; 50 veya 100 adetlik karton kutularda satışa sunulmaktadır.

Masticure Sağım

Meme İçi Merhem

Her 10 gram enjektör;
200 mg Sefaleksin monohidrat
100.000 IU Kanamisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI
Laktasyondaki ineklerde akut ve kronik mastitis olgularında kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kullanmadan önce hasta memeler mutlaka sağılıp sütü boşaltılmalıdır.
Meme başı uygun şekilde temizlendikten sonra her memeye 1 enjektör içeriği verilir.
Uygulama bir sonraki sağımda tekrar edilir.
Toplam üç uygulama yapılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 10 gün.
Sığır süt için: 5 gün (10 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (25°C 'nin altında) saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız. Güneş ışığından uzakta saklanır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
10 g'lık beyaz opak polietilen enjektörler; 50 veya 100 adetlik karton kutularda satışa sunulmaktadır.

Octafil

Meme İçi Süspansiyon

Her 10 ml enjektör:
40 mg Trimetoprim
200 mg Sülfadiazin içerir.

KULLANIM SAHASI
Laktasyondaki ineklerde akut ve kronik mastitis olgularında kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Kullanmadan önce hasta memeler mutlaka sağılıp sütü boşaltılmalıdır.
Meme başı uygun şekilde temizlendikten sonra her memeye 1 enjektör içeriği verilir.
Uygulama bir sonraki sağımda tekrar edilir.
Toplam üç uygulama yapılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 7 gün.
Sığır süt için: 2 gün (4 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda ısısında (15-25 °C) ve kuru yerde muhafaza ediniz.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
10 g'lık beyaz renkli polietilen enjektörler; 50 adetlik kutularda satışa sunulmuştur.

Total-4

Meme İçi Antibakteriyel ve Antienflamatuvar Süspansiyon

Her 5 gramlık enjektör:
100 mg Prokain penisilin
100 mg Streptomisin sülfat
100 mg Neomisin (sülfat halinde)
10 mg Prednizolon içerir.

KULLANIM SAHASI:
İneklerde laktasyon döneminde ağrı ve yangı ile seyreden; penisilin, streptomisin ve neomisine duyarlı bakterilerin oluşturduğu akut ve subakut mastitlerin tedavisinde kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Uygulama öncesi enfekte meme lobu sağılıp boşaltılmalı ve meme ucu temizlenmelidir. 5 gramlık enjektör içeriğinin tamamı meme içine verilmeli ve memeye yukarı doğru masaj yapılmalıdır.24 saat sonra aynı meme tekrar sağılarak boşaltılır ve uygulama günde bir defa olmak üzere arka arkaya üç defa tekrarlanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTLARI HAKKINDA UYARILAR:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Sığır et için: 7 gün.
Sığır süt için: 5 gün (10 sağım).

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Oda sıcaklığında (25°C'nin altında), ışıktan korunarak saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
5 gram süspansiyon içeren beyaz HDPE enjektörlerde; 50 ve 100 adet enjektör içeren karton kutularda satışa sunulmaktadır.

Mastar

Deri Losyonu

Her ml'si;
50 mg Çinko oksit içerir.
Yardımcı madde olarak;
Mentol, Kastor yağı,
kollodial silika
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Derideki yüzeysel yara ve sıyrıkları dış etkilerden korumak ve iyileşmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Sığır, at, koyun, keçi, domuz, köpek, kedi;
Lezyonlu bölgede ince koruyucu bir tabaka halinde elle veya bir fırça yardımıyla sürülür.
Günde en az iki kere olmak üzere lezyonun durumuna göre tekrarlanabilir.

ETKİLEŞİMLERİ:
Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Cilt üzerine başka yara bakım ürünleri, örneğin antiseptikler, antibiyotikler kullanılıyor ise veteriner hekime danışılmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:
Alerjik hayvanlarda reaksiyonlar gözlenebilir. Bu durumda uygulama kesilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
Serin ve direkt güneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15 - 25 °C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100, 200 ml'lik HDPE beyaz polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

Rumenas

Toz

ÜRÜNÜN BİLEŞENLERİ:

Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Besinsel Yem Katkı Maddeleri				
Amino Asitler				
3.1.1	Methionin	DL-Methionin %99	50	g/kg
İz Elementler				
E6	Çinko	Çinko sülfat %22	500	mg/kg
E3	Kobalt	Kobalt sülfat %30	400	mg/kg
E282	Kalsiyum	Kalsiyum propiyonat %98	500	g/kg
Bağırsak Flora Düzenleyicileri				
E1704	Saccharomyces cerevisiae $1x10^9$ CFU/g	Saccharomyces cerevisiae $1,7x10^{10}$ CFU/g	$1,7x10^8$	CFU/g
Taşıyıcılar				
	Magnezyum	Magnezyum oksit %54	100	g/kg
	Kalsiyum karbonat		332,1	g/kg

KULLANIM SAHASI:
Sığır, koyun ve keçilerde sindirim sistemi stimulasyonu amacıyla kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Ilık su ile içirilir.
Kuzu ve oğlaklara: 20 gram
Buzağı, koyun ve keçilere: 40 gram
Yetişkin sığırlara: 1-2 poşet verilir.
Uyulama günde 2 defa yapılır. İşletmeye yeni gelmiş hayvanlara ilk gün sadece Rumenas ve su verilerek stres kaynaklı sindirim sorunları önlenebilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI:
Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerde 25°C'de muhafaza edilir.
Üretim tarihinden itibaren 36 ay içerisinde kullanılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
100 g içeren alüminyum poşetlerde satışa sunulmuştur.

Viocid Blue

Deri Spreyi

200 ml metal şişe içinde;
10 mg Solvent Red
30 mg Solvent Blue
80 ml Tween 80
20 ml Gliserin
40 g Gas propellant (LPG)
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Sığır, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde çeşitli deri ve tırnaklardaki lezyonlarda bölgeyi dış etkilerden korumak ve doğal iyileşmeye yardımcı olmak için epitelyum koruyucu-fiziksel kapatıcı bir spreydir.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Uygulanan bölgenin belirlenmesi için mavi renkli boya ile işaretlenmiştir. Temizlenen bölgeye günde 2 kez 1-2 saniye süre püskürtülerek kullanılmaktadır. Memeye ve meme başına uygulandığında sağımdan önce memeler iyice yıkanmalıdır.

ETKİLEŞİMLERİ:
Önerilen kullanım şeklinde bilinen bir etkileşimi yoktur.

KONTRENDİKASYONLARI:
Göze uygulanmamalıdır. Açık ve derin yaralara, vücut boşluklarına çok büyük alanlara veya yanıklara uygulanmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Raf ömrü 3 yıldır.
Doğrudan güneş ışığından uzakta serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Isı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
Boş veya kullanılmayan ilaç kutuları tamamen boşaltıldıktan sonra çevre yönetmeliklerine uygun şekilde imha edilmelidir.
Boş kutular ateşe atılmamalı ve zorla açılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
200 ml'lik metal şişelerde satışa sunulmuştur.

Cestodan

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
55 mg Prazikuantel
içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Köpek ve kedilerde şerit mücadelesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Köpek ve kediler için pratik doz; Her 10 kg canlı ağırlık için 1 ml.
Echinococcus (kist hidatik) kontrolünde ilaç kas içi kullanılmalıdır.
3 ml'yi geçen deri altı uygulamalarda doz ikiye bölünerek iki ayrı enjeksiyon noktasına uygulama yapılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Oda sıcaklığında (15-25°C) saklanır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içinde 10 ml'lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmaktadır.

Combipet

Oral Tablet

Her tablette;
150 mg Fenbendazol
144 mg Pirantel pamoat
50 mg Prazikuantel
içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Köpek, kedi ve diğer etçil hayvanlarda yuvarlak kurtlar ve şeritlerin neden olduğu paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Oral yolla yutturularak veya yem içinde verilerek kullanılır.
Tedavi dozu bölünmeden bir kerede verilmelidir.
Pratik doz:
5 kg'a kadar olan hayvanlara yarım tablet,
5-10 kg arasında olan hayvanlara 1 tablet,
10 kg'dan büyük hayvanlara her 5 kg için yarım tablet verilir (Örneğin 50 kg'lık bir köpek için 5 tablet).
Uygulama üçer aylık aralıklarla tekrar edilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalıdır.
Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde; 10 adet tablet içeren blisterde 10 (10x1), 50 (10x5) ve 100 (10x10) adet tablet şeklinde satışa sunulmuştur.
Her kutuda hayvanın sağlık karnesine yapıştırılmak üzere etiket bulunur.

Reversal

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
5 mg Atipamezol HCl
içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Köpek ve kedilerde medetomidine bağlı etkilerin giderilmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Köpek ve kedilere kas içi enjekte edilir.
Uygulama medetomidin uygulamasından 15-60 dakika sonra yapılır. Hayvanların medetomidin'e bağlı sedasyondan normale dönmesi 5-10 dakika içerisinde gerçekleşir.
Köpeklerde Reversal'ın µg / kg canlı ağırlık olarak dozu, medetomidinin 5 katıdır. Pratik olarak 40 µg / kg canlı ağırlık (0,4 ml / 10 kg) medetomidin uygulanan bir köpeğe, 200 µg / kg canlı ağırlık atipamezol (Reversal 0,4 ml / 10 kg) uygulanmalıdır.
Kedilerde Reversal'ın µg / kg canlı ağırlık olarak dozu, medetomidinin 2,5 katıdır. Pratik olarak 80 µg / kg canlı ağırlık (0,4 ml / 5 kg) medetomidin uygulanan bir kediye, 200 µg / kg canlı ağırlık atipamezol (Reversal 0,2 ml / 5 kg) uygulanmalıdır. Kedilerde Reversal'ın µg / kg canlı ağırlık olarak dozu, daha önce uygulanan medetomidin dozunun 4 katını aşmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25 °C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılan ambalaj 28 gün süresince kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde 10 ml'lik amber rengi cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

Sedapet

Oral Süspansiyon

Her ml'si;
10 mg Asepromazin'e eşdeğer
Asepromazin maleat
içerir.

KULLANIM SAHASI:
Köpek, kedi ve atlarda:
- Sakinleştirici ve preanestezik olarak,
- Uzun yolculuklarda ortaya çıkan rahatsızlıkları önlemek,
- Muayene ve tedavi sırasında sakinleştirmek,
- Alerji ve kaşıntıları geçici olarak durdurmak amacıyla kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:
Oral yolla kullanılır. Kullanım ayrıntıları için prospektüsü okuyunuz.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25°C'nin altında saklanmalıdır. Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde 10 ml'lik beyaz polietilen şırıngalarda satışa sunulmuştur.

Tomidin

Enjeksiyonluk Çözelti

Her ml'si;
1 mg Medetomidin HCl
içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:
Köpek ve kedilerde; sedasyon veya analjezi gerektiren muayene ve tedaviler öncesinde, hayvanların kontrol altında tutulması istendiğinde sakinleştirici olarak (röntgen filmi çekimi, dişlerin tedavisi, kulağın temizlenmesi, yaraların dikilmesi, deri tümörlerinin eksizyonu ve erkek kedilerin kastrasyonu gibi küçük cerrahi operasyonlarda) enjeksiyon ve inhalasyon ile oluşturulan genel anesteziler öncesi preanestezik olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Kullanım şekli ve dozu için prospektüsü okuyunuz.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
25 °C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılan ambalaj 28 gün süresince kullanılabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Karton kutu içerisinde 10 ml'lik amber rengi cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

Notlar

Sıra	Ürün adı	Formu	Koli miktarı		
01	Amoxycure-LA Enjeksiyonluk Süsp.	100 ml	100		
02	Amoxycure-LA Enjeksiyonluk Süsp.	250 ml	40		
03	Amoxycure-LA Enjeksiyonluk Süsp.	50 ml	100		
04	Antistamin C Enjeksiyonluk Çözelti	20 ml	100		
05	Antistamin C Enjeksiyonluk Çözelti	50 ml	100		
06	Ca-25 Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
07	Ca-25 Enjeksiyonluk Çözelti	250 ml	40		
08	Calcıcaf Enjeksiyonluk Çözelti	500 ml	1 Separatörde 12 adet, Kolide 24 adet		
09	Cefamilk-180 Mono Enj. Süspansiyon	100 ml	100		
10	Cefamilk-180 Mono Enj. Süspansiyon	250 ml	40		
11	Cefcloren Enjeksiyonluk Süspansiyon	100 ml	100		
12	Cefcloren Enjeksiyonluk Süspansiyon	250 ml	40		
13	Clavon Enjeksiyonluk Süspansiyon	100 ml	100		
14	Clavon Enjeksiyonluk Süspansiyon	50 ml	100		
15	Dexacure Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
16	Dexacure Enjeksiyonluk Çözelti	50 ml	100		
17	Doxaprol Enjeksiyonluk Çözelti	2 ml x 24'lü	1 Kutu 24 adet, 15 x 24 : 360 adet		
18	Doxymix %20 Oral Solüsyon	100 ml	60		
19	Fertilin Enjeksiyonluk Çözelti	20 ml	100		
20	Fertilin Enjeksiyonluk Çözelti	5 ml x 10'lu	1 Koli 17 Kutu, Toplam 170 adet		
21	Fıtadinon-K Enjeksiyonluk Çözelti	20 ml	100		
22	İmozan Enjeksiyonluk Çözelti	20 ml	100		
23	İmozan Enjeksiyonluk Çözelti	50 ml	100		
24	İnflamex Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
25	İnflamex Enjeksiyonluk Çözelti	250 ml	40		
26	Mastar Losyon Harici Süspansiyon	125 ml	100		
27	Masticure Kuru Meme içi Süspansiyon	10 ml x 50'li	1 Kutu 50 adet. 1 Kolide 450 adet		
28	Masticure Meme içi Süspansiyon	10 gr x 50'li	1 Kutu 50 adet. 1 Kolide 450 adet		
29	Mectizan IC Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
30	Mectizan IC Enjeksiyonluk Çözelti	250 ml	40		
31	Mectizan IC Enjeksiyonluk Çözelti	50 ml	100		
31	Minoprost Enjeksiyonluk Çözelti	2 ml x 24'lü	1 Kutu 24 adet, 15 x 24 : 360 adet		
33	Mucolit Enjeksiyonluk Çözelti	50 ml	100		
34	Neuron-B Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
35	Octafil Memeiçi Suspansiyon	10 gr x 50'li	1 Kutu 50 adet. 1 Kolide 450 adet		
36	Ovitap Oral Tablet	10 tablet	480		
37	Ovostim Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
38	Penstrep 20/20 Enjeksiyonluk Süsp.	100 ml	100		
39	Penstrep 20/20 Enjeksiyonluk Süsp.	250 ml	40		
40	Penstrep 20/20 Enjeksiyonluk Süsp.	50 ml	100		
41	Provet D3 Enjeksiyonluk Çözelti	10 ml	100		
42	Provet Oksitosin Enjeksiyonluk Çözelti	10 ml	100		
43	Provet Oksitosin Enjeksiyonluk Çözelti	50 ml	100		
44	Provet Vitamin C Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
45	Rumenas Kombine	100 gr	1 Kutuda 10 Poşet. Kolide 240 Poşet		
46	Scoban Enjeksiyonluk Çözelti	50 ml	100		
47	Sulfamid-T Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
48	Tetraplex-LA	100 ml	100		
49	Tetraplex-LA	250 ml	40		
50	Tetraplex-LA	50 ml	100		
51	Tobrofin Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
52	Tobrofin Enjeksiyonluk Çözelti	250 ml	40		
53	Total-4 Meme içi Süspansiyon	5 gr x 50'li	1 Kutu 50 adet. 1 Kolide 450 adet		
54	Vetamin Forte Oral Çözelti	1 lt	20		
55	Viocid Blue Harici Sprey	200 ml	4 x 25 : 100 adet		
56	Viodox Antibiotikli Deri Spreyi	200 ml	4 x 25 : 100 adet		
57	Vitaljek Enjeksiyonluk Çözelti	100 ml	100		
58	Vitaljek Enjeksiyonluk Çözelti	250 ml	40		
59	Vitaljek Enjeksiyonluk Çözelti	50 ml	100		
60	Cestodan	10 ml			
61	Combipet	50 Tablet			
62	Ksilazol Enj. (Ksilazin HCl)	20 ml	100		
63	Ksilazol Enj. (Ksilazin HCl)	50 ml	100		
64	Reversal Enj. (Atipamezole)	10 ml	100		
65	Sedapet	10 ml			
66	Tomidin Enj. (Medetomidin)	10 ml	100		